La monodose de midazolam est emballée dans un carton qui contient une seringue recouverte d'un bouchon rouge et un embout nasal.

Mode d'emploi de la monodose de Midazolam nasal

Juste avant l'emploi, dévisser le bouchon rouge en tenant la seringue.	
Visser l'embout nasal sur la seringue.	
Appliquer l'embout nasal au niveau de la narine, puis presser le piston de la seringue.	

Remarque

L'efficacité du midazolam par voie buccale a aussi été démontrée dans le traitement d'urgence des crises d'épilepsie chez les enfants[1].

> Si le midazolam est administré **par la bouche**, **NE PAS UTILISER LE DISPOSITIF NASAL,** en raison du risque de le mordre ou de l'avaler ! Si la voie buccale est choisie, il suffit de **dévisser le bouchon rouge** et d'utiliser directement la seringue.

Conservation

La seringue et le dispositif doivent être conservés **dans le carton d'origine jusqu'à utilisation,** à température ambiante (15 - 25°C) et à l'abri de la lumière, jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'étiquette.

Elimination

Les déchets sont à éliminer dans une poubelle ménagère.

[1] J. McIntyre et al., Safety and efficacy of buccal midazolam versus rectal diazepam for emergency treatment of seizures in children : a randomised controlled trial, Lancet, 2005, 366(16) : 205-10 (+ comment in Lancet, 2005, 366(16) :182-3)
Source image: information du fabricant

Copyright © Pharmacie Interhospitalière de la Côte, 2015